

FICHA TÉCNICA

Página 1 de 3
Revisión: 13
Fecha Revisión: 21-06-2023

PRODUCTO:
FERTICHEM® FRUIT



I. Nombre Comercial	: FERTICHEM® FRUIT
II. Ingrediente Activo	: Fósforo y potasio
III. Tipo	: FERTILIZANTES FOLIARES CONVENCIONALES Y ORGÁNICOS
IV. Concentración	: Fósforo (P ₂ O ₅)25,00 % p/v Potasio (K ₂ O)40,00 % p/v
V. Densidad	: 1,4 – 2,0 g/ml
VI. pH	: 7,0 –8,0
VII. Formulación	: Concentrado Soluble, SL
VIII. Modo de Acción	: Absorción foliar
IX. Proveedor	: Chemie Agroveterinaria ®S.A.C.
X. Autorización SENASA	: N/A
XI. Características	: FERTICHEM® FRUIT es un nutriente foliar balanceado a base de fósforo (P) y potasio (K), los cuales son tomados por la planta en forma inmediata y traslocados a través de sus hojas y tallos; gracias a los aminoácidos presentes. Posee un adecuado contenido de fósforo que estimula el sistema radicular, flor y semilla, además permite acelerar la madurez de la fruta. Por el alto contenido de potasio, se logra un mejor llenado de frutos u otros órganos cosechables. Especialmente recomendado para cultivos que tengan floración y cuajado a la vez, promoviendo así una adecuada floración, cuajado y llenado. FERTICHEM® FRUIT incrementa la floración y fructificación, mejora el color de las frutas, en especial en las manzanas y uvas, debido a que incrementan su nivel de antocianinas. FERTICHEM® FRUIT es un regulador de la acidez de las frutas, especialmente de los cítricos e incrementa el nivel de aceite en diversos cultivos.
XII. Compatibilidad	: Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad.
XIII. Fitotoxicidad	: No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

XIV. Precauciones

: Agitar bien el producto antes de usar. Almacenar el producto en lugar seguro, fresco y seco en su envase original debidamente cerrado y etiquetado, lejos de alimentos, medicinas. Mantener fuera del alcance de personas no autorizadas.

Temperatura de almacenamiento recomendada: 5 – 40 °C.

XV. Instrucciones de uso:

CULTIVO	DOSIS (L/Ha)	RECOMENDACIONES
Uva de mesa	2,5 – 5,0	Aplicar en pre floración, al cuajado y al llenado de racimos.
Mango	2,0 – 3,0	Aplicar en pre floración, floración, cuajado, llenado y acabado de frutos.
Limón, naranja, mandarina, tangelo.	2,5 – 5,0	Aplicar al inicio del brotamiento y floración y repetir al cuajado de los frutos.
Palto	2,5 – 5,0	Aplicar en pre floración, floración, cuajado, llenado y acabado de frutos.
Arándano Fresa	2,0 – 3,0	Aplicar en brotamiento, floración y cuajado.
Alcachofa	2,0 – 3,0	Macollamiento, inicio y llenado de inflorescencia.
Banano	2,0 – 3,0	Aplicar a la aparición de la inflorescencia, al llenado y acabado de frutos.
Arroz	2,0 – 3,0	Macollamiento, inicio de flor y llenado de granos.
Espárrago	2,0 – 3,0	Aplicar a la apertura de los filocladios durante el desarrollo del 1° y 2° brote.
Lechuga, col, brócoli, apio, coliflor, zanahoria.	2,0 – 3,0	Aplicar a los 30 y 45 días de la siembra.
Papa	2,0 – 3,0	Aplicar al llenado de tubérculo.
Leguminosas	2,0 – 3,0	Aplicar en pre floración, repetir 15 y 30 días después.
Melón, Sandía, Pepino	2,0 – 3,0	Aplicar en pre floración, al cuajado y al llenado de frutos.

FICHA TÉCNICA

Página **3** de **3**
Revisión: 13
Fecha Revisión: 21-06-2023

PRODUCTO:
FERTICHEM® FRUIT



Tomate	2,0 – 3,0	Aplicar en pre floración, floración, cuajado, llenado y acabado de frutos.
Ají, pimiento, paprika, piquillo.		

Ficha técnica válida para Perú.