

FICHA TÉCNICA

Página 1 de 3
Revisión: 14
Fecha Revisión: 11-07-2023

PRODUCTO:
ORGANICHEM CALCIO



I. Nombre Comercial	: ORGANICHEM CALCIO
II. Ingrediente Activo	: Calcio
III. Tipo	: FERTILIZANTES FOLIARES CONVENCIONALES Y ORGÁNICOS
IV. Concentración	: Calcio (CaO)23,00 % p/v
V. Densidad	: 1,18 – 1,38 g/ml
VI. pH	: 6,5 – 8,5
VII. Formulación	: Suspensión Concentrada, SC
VIII. Modo de Acción	: Absorción foliar y radicular
IX. Proveedor	: Chemie Agroveterinaria® S.A.C.
X. Autorización SENASA	: N/A
XI. Características	: ORGANICHEM CALCIO en un fertilizante orgánico con una alta concentración de calcio que previene y corrige las posibles deficiencias de calcio en todo tipo de cultivos. ORGANICHEM CALCIO logra un excelente desarrollo de las raíces, ramas, brotes y frutos especialmente porque logra dar una mayor firmeza a la piel, otorgándoles mayor protección frente a patógenos. Además, está especialmente indicado para desordenes fisiológicos asociados a la deficiencia de calcio como son la podredumbre apical en tomate y pimientos, nariz blanda en mango, rajado de frutos en mandarina, aumenta la firmeza de la fruta e incrementa la resistencia a enfermedades.
XII. Compatibilidad	: ORGANICHEM CALCIO es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios. Al mezclar ORGANICHEM CALCIO con productos fitosanitarios, debe ser incorporado como último componente de la mezcla. Las mezclas con fitosanitarios deben ser aplicadas inmediatamente después de su preparación y agitarse constantemente.
XIII. Fitotoxicidad	: No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.
XIV. Precauciones	: ORGANICHEM CALCIO es un producto de muy baja toxicidad, no corrosivo, no volátil, no explosivo, no irritante, inodoro, estable a la luz y a temperaturas de hasta 40 °C.

Sin embargo, se recomienda lo siguiente:

- Proteger los ojos al momento de aplicarlo. Si entra en contacto con los ojos, lávelos profusamente con agua. Si la irritación persistiera consulte con un médico.
 - NO vierta ORGANICHEM CALCIO puro directamente a pozos, riachuelos, ríos o lagos.
 - Reingreso al área tratada: No existe restricción.
 - No existe restricción en cuanto al tiempo de reingreso al área tratada
- Temperatura de almacenamiento recomendada: 5 – 40 °C.

XV. Instrucciones de uso:

Aplicación por fertirrigación:

- Frutales, Cítricos y vides: 3 – 6 L/ha (2 – 5 aplicaciones).
- Hortalizas: 2 L/ha (cada 15 días).

Aplicaciones Foliares: 400 – 800 ml/200 L de agua.

CULTIVO	PROBLEMA Y CONTROL	DOSIS (L/ha)	RECOMENDACIONES
Palto	Moteado de la pulpa, aumenta la resistencia a enfermedades.	3 - 6	Efectuar 3 aplicaciones a partir del fruto cuajado.
Arándano, fresa, frambuesa.	Aumenta la firmeza de la fruta. Aumenta la resistencia a enfermedades.	3 - 6	Realizar las aplicaciones a partir del fruto cuajado según los ciclos de floración.
Uva de mesa.	Aumenta la firmeza de las bayas. Reduce la caída prematura de la baya	3 - 6	3 a 5 aplicaciones a partir del brote de 40-50 cm. Repetir la aplicación cada 10 días hasta la 2ª aplicación de crecimiento en variedades sin semillas y en variedades con semillas hasta baya de 6 mm.
Limón, naranja, mandarina, tangelo, clementina.	Mejora la firmeza de la fruta. Reduce la caída de la fruta. Aumenta la resistencia a enfermedades.	3 - 6	Efectuar de 2 a 3 aplicaciones, cada 10 días a partir del fruto cuajado.
Mango	Control de “nariz blanda”, mayor firmeza del fruto.	3 - 6	Efectuar de 2 a 3 aplicaciones a partir del desarrollo del fruto.

FICHA TÉCNICA

Página **3** de **3**
 Revisión: 14
 Fecha Revisión: 11-07-2023

PRODUCTO:
ORGANICHEM CALCIO



Banano	Mejora la consistencia del fruto y de la cascara.	0.5 - 1.0 100 – 200 ml / 200 L agua	Aplicar al aparecer la 6 hoja y repetir antes de la aparición de la hoja bandera.
Olivo, pecano.	Mejora la firmeza de la fruta. Aumenta la resistencia de enfermedades.	3 - 6	4 a 5 aplicaciones a partir de cuajado.
Coliflor, col, brócoli, lechuga.	Necrosis en hojas y tallos, ennegrecimientos de hojas jóvenes, quemaduras en puntas de raíces.	2 - 4	4 a 6 aplicaciones empezando antes de la formación de la cabeza.
Alcachofa	Pardeamiento de la cabeza, Necrosis en hojas y tallos, ennegrecimientos de hojas jóvenes.	2 - 4	4 a 6 aplicaciones empezando antes de la formación del escapo floral.
Apio	Corazón negro.	2 - 4	Aplicar 25 días después del trasplante, repetirlas cada 10 días.
Pepino, melón, sandía Pimiento, piquillo, paprika. Tomate.	Necrosis apical, ennegrecimiento de hojas jóvenes. Aumenta la resistencia a enfermedades.	2 - 4	Efectuar 4 a 6 aplicaciones desde inicio del cuajado de frutos.
Papas	Pardeamiento interno. Aumenta la resistencia a enfermedades y mejora almacenamiento.	2 - 4	Aplicar de 3 a 4 veces desde el inicio de la tuberización.
Café, Cacao	Ayuda a evitar la caída prematura de flores y fruto recién cuajados.	2 - 4	Aplicar antes de la floración y durante el desarrollo de los frutos.

Ficha técnica válida para Perú.